

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉีดเป็นเข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 - 17 ปี

พิจารณาภายใต้

1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลการใช้วัคซีนตามที่ให้บริการจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) ร่วมกับ
3. เจือจางในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
4. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	เข็มที่ 1	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3
ผู้ที่มีอายุ 5 - 6 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ถึงกำหนด
ผู้ที่มีอายุ 6 - 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ถึงกำหนด
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ถึงกำหนด
ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี	Pfizer ฝาสีม่วง	3 - 4 สัปดาห์*	Pfizer ฝาสีม่วง	4 - 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส / ครึ่งโดส**
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	4 - 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส
ผู้ที่มีอายุ 6 - 17 ปี	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม / ฝาสีม่วง เต็มโดส ตามช่วงอายุ

แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามหลักการเดียวกันกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ

* ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำระยะห่าง 8 สัปดาห์

** ผู้ที่รับวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงครบ 2 เข็ม สามารถเลือกรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงขนาดครึ่งโดสหรือเต็มโดสได้ โดยให้เป็นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก

ทั้งนี้หากประสงค์รับผ่านระบบสถานศึกษาจะเป็นการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงครึ่งโดส สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงเต็มโดสผ่านระบบสถานพยาบาล

ผู้ที่มีเงื่อนไขเฉพาะ มีความจำเป็น หรือ มีข้อจำกัดในการรับวัคซีนตามแนวทางการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ให้หน่วยบริการพิจารณาฉีดวัคซีนตามดุลพินิจของแพทย์
ภายใต้หลักวิชาการ คำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน